

出血リスクの高い消化管内視鏡診療における休止薬と休止日数一覧(目安)

参考：抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン2012、追補版2017参照

分類	成分名	代表商品名	内視鏡休薬目安(出血高危険度の場合)			備考	
			単剤	2剤併用	3剤併用		
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン、アスピリン末 バファリン配合錠A81 タケルダ配合錠	休薬なし (可能なら3~5日前 から休薬)	休薬なし(シロスタゾールへの置換も可)			
	シロスタゾール	プレタール	1日前	休薬なし(併用薬にアスピリン有なら1日前に休薬)			
	サルポグレラート塩酸塩	アンプラーグ	1日前				
	チ エ ノ ピ リ ジ ン 系	チクロピジン塩酸塩	パナルジン、チクロピジン錠	5~7日前	・アスピリン、シロスタゾールとの併用あり → 5~7日前から休薬 ・アスピリン、シロスタゾールとは併用なし → アスピリンまたはシロスタゾールに置換		
		クロピドグレル硫酸塩	プラビックス				
プラスグレル塩酸塩		エフィエント					
アスピリン・クロピドグレル硫酸塩		コンプラビン配合錠	5~7日前よりアスピリン単独に変更				
抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン	継続かDOACへ切替	継続かヘパリン置換かDOACへ切替		・術前にINRが治療域である事を確認する ・DOACへの切替は適応に注意する	
	D O A C	ダビガトランエテキシラート	プラザキサ	当日朝より休止 翌日より再開(ガイドライン参照)			
		エドキサバントシル酸塩	リクシアナ				
		リバーロキサバン	イグザレルト				
		アピキサバン	エリキュース				
脂質異常症用薬	EPA	エパデールS,イコサペント酸エチル					
	EPA・DEA	ロトリガ粒状Cap					
PG製剤	リマプロストアルファデクス	オパルモン、プロレナール	1日前				
	ベラプロストナトリウム	ドルナー					
冠血管拡張剤	ジピリダモール	ペルサンチン,ペルサンチンL					
	塩酸ジラセプ	コメリアンコーワ錠					
	塩酸トラピジル	ロコルナール					
脳循環・ 代謝改善薬	酒石酸イフェンプロジル	セロクラール	休薬なし			ガイドラインに記載なし	
	カリジノゲナーゼ	カルナクリン					
	イブジラスト	ケタスCap					
	ニセルゴリン	サアミオン					
糖尿病薬	全ての糖尿病薬	ー	当日朝より休止				

※ 休止薬の再開に関しては、内視鏡的に止血が確認されてから早期に再開することを基本とする