

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0680 (BEV5mg) 、CO0670 (BEV10mg) 、CO0700 (初回・BEV5mg) 、CO0690 (初回・BEV10mg)
レジメン名	Bmab+FOLFIRI 療法
コースの日数	14 日
催吐リスク	中等度+a

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	～	～	Day14
	生食 20ml		ホ-ト洗浄用	●					
	生食 50ml		ライン-フ°用	●					
抗癌剤	ハバシママ°注 生食 100ml	5・10mg/kg	初回 90 分 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗がん剤 制吐剤	ブスバ°注 アロカリス注 デキサト注 パロセトン注 50ml	20mg/body 235mg/body 6.6mg/body 0.75mg/body	30 分	●					
抗癌剤	イリリカ°注 (CPT-11) 5%ブドウ糖 250ml	150mg/m ²	120 分 LV と同時	●					
	レボリナト注 (LV) 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m ²	120 分 CPT-11 と同時	●					
抗癌剤	フルオウラニル注 生食 50ml	400mg/m ²	急速静注	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗癌剤	フルオウラニル注 生食 50ml	2400mg/m ²	46 時間 インナー-サー-ホ°ン°	●	●	●			
	生食 10ml シリジ°		ホ-ト洗浄用			●			