

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0100、CO0130（初回）
レジメン名	CET+FOLFIRI ホート
コースの日数	14日
催吐リスク	中等度+a

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	～	Day7	～	Day14
	生食 20ml		ホート洗浄用	●				●		
	生食 50ml		ラインプ用	●				●		
抗アルギン-剤 制吐剤	ホラミン注 デキスト注 生食 50ml	5mg/body 6.6mg/body	5分	●				●		
抗癌剤	アビタックス注 生食 250ml	初回：400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	初回 120分 2回目以降 60分	●				●		
	生食 50ml		ライン洗浄用	●				●		
抗コリン剤 制吐剤	ブスコパン注 アロキサ注 パロセチン注 50ml	20mg/body 235mg/body 0.75mg/body	30分	●						
抗癌剤	リリネカン注（CPT-11） 5%ブドウ糖 250ml	150mg/m <sup>2</sup>	120分 LVと同時	●						
	レボリネカン注（LV） 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m <sup>2</sup>	120分 L-OHPと同時	●						
抗癌剤	カルボキシ注 生食 50ml	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	●						
	生食 50ml		ライン洗浄用	●						
抗癌剤	カルボキシ注 生食 50ml	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間 インフューザーホーン	●	●	●				
	生食 10ml シリンジ		ホート洗浄用			●		●		