

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 対象臓器    | 大腸                    |
| レジメンコード | CO0720、CO0710（初回）     |
| レジメン名   | Bmab+IRIS・国がん（SIRB療法） |
| コースの日数  | 21日                   |
| 催吐リスク   | 中等度+a                 |

| 種類  | 薬剤名                            | 用量                                      | 点滴時間                           | Day1 | Day2                          | ～ | ～ | ～ | Day21 |
|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
|     | 生食 250ml                       |   | ラインキープ用                        | ●    |                               |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | ハバシマブ注<br>生食 100ml             | 7.5mg/kg                                | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目以降 30分 | ●    |                               |   |   |   |       |
|     | 生食 50ml                        |   | ライン洗浄用                         | ●    |                               |   |   |   |       |
| 制吐剤 | アロカリス注<br>テグサト注<br>パロセチン注 50ml | 235mg/body<br>6.6mg/body<br>0.75mg/body | 30分                            | ●    |                               |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | イリリカ注<br>5%ブドウ糖 250ml          | 150mg/m <sup>2</sup>                    | 90分                            | ●    |                               |   |   |   |       |
|     | 生食 50ml                        |   | ラインフラッシュ用                      | ●    |                               |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | エヌタケル OD錠                      | 80mg/m <sup>2</sup> ※                   | 1日2回                           | ●    | Day1 は夕食後から服用開始。14日間服用、7日間休薬。 |   |   |   |       |

※エヌタケル OD錠の用量は、添付文書に準ずる。