

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0170
レジメン名	PANI+IRIS-2 療法
コースの日数	28 日
催吐リスク	中等度

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day15	Day16	Day17	～	Day28
	生食 250ml		ラインキ-プ [®] 用	●			●				
抗アレルギー剤 制吐剤	ホ [®] ラミン注 デ [®] キート注 パ [®] ロセトン注 50ml	5mg/body 9.9mg/body 0.75mg/body	5 分	●			●				
抗癌剤	ハ [®] クテ化 [®] ックス注 生食 100ml	6mg/kg	60 分	●			●				
	生食 50ml		ライン洗浄用	●			●				
抗癌剤	イリリ [®] カン注 5%ブドウ糖 250ml	125mg/m ²	90 分	●			●				
	生食 50ml		ラインフラッシュ [®] 1用	●			●				
抗癌剤	エ [®] ワ [®] タイ [®] OD 錠	80mg/m ² ※	1 日 2 回	●	Day1 は夕食後から服用開始。14 日間服用、14 日間休薬。						
制吐剤	デ [®] カ [®] ロ [®] 錠	Day2-3 : 8mg	1 日 1～2 回		●	●		●	●	(院外処方)	

※エ[®]ワ[®]タイ[®] OD 錠の用量は、添付文書に準ずる。