

対象臓器	尿路上皮
レジメンコード	BL0071
レジメン名	尿路上皮 GC 療法
コースの日数	28 日
催吐リスク	高度

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day8	Day15	～	Day28
	ソリタ T3 500ml	ハイドレーション			●:6hr	●:5hr	●:6hr	●:6hr	●:6hr				
	ヴェーン F 500ml	ハイドレーション			●:3hr	●:5hr	●:6hr	●:6hr	●:6hr				
	ソリタ T3 500ml	ハイドレーション			●:3hr	●:5hr	●:6hr	●:6hr	●:6hr				
	ヴェーン F 500ml	ハイドレーション				●:5hr	●:6hr	●:6hr	●:6hr				
	生食 250ml		ライン-プ用	●		●:3hr				●	●		
制吐剤	デキスト注 パロメトロン 50ml	9.9mg/body 0.75mg/body	5 分		●								
制吐剤	デキスト注 生食 50ml	6.6mg/body	5 分	●						●	●		
抗癌剤	ゲムシタン注 生食 100ml	1000mg/m ²	30 分	●						●	●		
	生食 50ml		ライン洗浄用							●	●		
利尿剤	20%マンニトール注 150ml		30 分		●								
抗癌剤	シスプラチン注 生食 500ml	70mg/m ²	120 分		●								
利尿剤	20%マンニトール注 150ml		30 分		●								
	ヴェーン F 500ml	ハイドレーション			●:2hr								
	ソリタ T3 500ml	ハイドレーション			●:2hr								
	ヴェーン F 500ml	ハイドレーション			●:2hr								
	ソリタ T3 500ml	ハイドレーション		●:12hr	●:3hr								
制吐剤	アプロピタントカフェル	Day2 : 125mg Day3-4 : 80mg			●	●	●	Day2 は抗癌剤投与 60～90 分前に服用 Day3-4 は午前中に服用					