

対象臓器	脾臓
レジメンコード	PA0010
レジメン名	脾 FOLFIRINOX ホート
コースの日数	14日
催吐リスク	高度

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	～	Day14
	生食 20ml		ホート洗浄用	●					
	生食 50ml		リンキープ用	●					
制吐剤	アロカリス注 デキサト注 パロセトロン注 50ml	235mg/body 6.6mg/body 0.75mg/body	30分	●					
抗癌剤	オキサリプラチン注 (L-OHP) 5%ブドウ糖 250ml	85mg/m <sup>2</sup>	120分	●					
抗コリン剤	アスパノン注 生食 20ml	20mg/body	緩徐に静注	●					
抗癌剤	イリリカ注 (CPT-11) 5%ブドウ糖 250ml	180mg/m <sup>2</sup>	120分 LVと同時	●					
	レボレチナート注 (LV) 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m <sup>2</sup>	120分 CPT-11 と同時	●					
	生食 50ml		リン洗浄用	●					
抗癌剤	フルオウラシル注 生食 50ml	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	●					
抗癌剤	フルオウラシル注 生食 50ml	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間 インターサートポンプ	●	●	●			
	生食 10ml シンジ		ホート洗浄用			●			
制吐剤	デキサメタゾン錠	Day2-4 : 8mg	1日 1～2回		●	●	●		