

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0310、CO0320（初回）
レジメン名	CET+FOLFOX 療法
コースの日数	14 日
催吐リスク	中等度+a

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	～	Day7	～	Day14
	生食 20ml		ホート洗浄用	●				●		
	生食 50ml		ラインクープ用	●				●		
抗アルギン酸- 制吐剤	ホラミン注 デキスト注 生食 50ml	5mg/body 6.6mg/body	5 分	●				●		
抗癌剤	アビタックス注 生食 250ml	初回：400mg/m <sup>2</sup> 2 回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	60 分	●				●		
	生食 50ml		ライン洗浄用	●				●		
制吐剤	アガリス注 グラセトン注 100ml	235mg/body 3.0mg/body	30 分	●						
抗癌剤	オキサリプラチン注（L-OHP） 5%ブドウ糖 250ml	85mg/m <sup>2</sup>	120 分 LV と同時	●						
	レボリナート注（LV） 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m <sup>2</sup>	120 分 L-OHP と同時	●						
抗癌剤	カルボプラチン注 生食 50ml	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	●						
	生食 50ml		ライン洗浄用	●						
抗癌剤	カルボプラチン注 生食 50ml	2400mg/m <sup>2</sup>	46 時間 インフューザーポンプ	●	●	●				
	生食 10ml シリンジ		ホート洗浄用			●		●		