

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0850
レジメン名	FOLFOXIRI ホート
コースの日数	14日
催吐リスク	高度

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	～	Day14
	生食 20ml		ホート洗浄用	●					
	生食 50ml		ラインキープ用	●					
抗コリン剤 制吐剤	アスロパオン注 アロプリピル注 デキサメタゾン注 パロメチン注 50ml	20mg/body 235mg/body 6.6mg/body 0.75mg/body	30分	●					
抗癌剤	イリリカチン注 (CPT-11) 5%ブドウ糖 250ml	165mg/m <sup>2</sup>	60分	●					
抗癌剤	オキサリプラチン注 (L-OHP) 5%ブドウ糖 250ml	85mg/m <sup>2</sup>	120分 LVと同時	●					
	レボレボネチン注 (LV) 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m <sup>2</sup>	120分 L-OHPと同時	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗癌剤	フルオウラシル注 生食 50ml	3200mg/m <sup>2</sup>	46時間 インフューザーホート	●	●	●			
	生食 10ml シリンジ		ホート洗浄用			●			
制吐剤	デキサメタゾン錠	Day2-4 : 8mg	1日 1～2回		●	●	●		