

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0830、CO0810（初回）
レジメン名	Bmab+FOLFOXIRI ホート
コースの日数	14日
催吐リスク	高度

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	～	Day14
	生食 20ml		ホート洗浄用	●					
	生食 50ml		ラインクープ用	●					
抗癌剤	ヘバシマブ注 生食 100ml	5mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗コリン剤 制吐剤	ブスコパン注 アロキス注 デキサメト注 パロメト注 50ml	20mg/body 235mg/body 6.6mg/body 0.75mg/body	30分	●					
抗癌剤	イリリカン注（CPT-11） 5%ブドウ糖 250ml	165mg/m ²	60分	●					
抗癌剤	オキサリプラチン注（L-OHP） 5%ブドウ糖 250ml	85mg/m ²	120分 LVと同時	●					
	レボレチナート注（LV） 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m ²	120分 L-OHPと同時	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗癌剤	フルオウラシル注 生食 50ml	3200mg/m ²	46時間 インフューザーホート	●	●	●			
	生食 10ml シンガ		ホート洗浄用			●			

制吐剤	テカトロン錠	Day2-4 : 8mg	1日1~2回		●	●	●		
-----	--------	--------------	--------	--	---	---	---	--	--