

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 対象臓器    | 肺                 |
| レジメンコード | LU0120、LU0130（初回） |
| レジメン名   | 肺 CBDCA+PEM+BEV   |
| コースの日数  | 21 日              |
| 催吐リスク   | 中等度+a             |

| 種類  | 薬剤名                           | 用量                                     | 点滴時間                                | Day1 | Day2 | ～ | ～ | ～ | Day21 |
|-----|-------------------------------|--|-------------------------------------|------|------|---|---|---|-------|
|     | 生食 250ml                      |  | ラインアップ用                             | ●    |      |   |   |   |       |
| 制吐剤 | アロカス注<br>デキサト注<br>ゲラセト注 100ml | 235mg/body<br>6.6mg/body<br>3.0mg/body | 30 分                                | ●    |      |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | ヘマトレキド注<br>生食 100ml           | 500mg/m <sup>2</sup>                   | 10 分                                | ●    |      |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | カサプロリン注<br>5%ブドウ糖 250ml       | AUC 5 ※                                | 60 分                                | ●    |      |   |   |   |       |
|     | 生食 50ml                       |  | ライン洗浄用                              | ●    |      |   |   |   |       |
| 抗癌剤 | ヘパシズマブ注<br>生食 100ml           | 15mg/kg                                | 初回 90 分<br>2 回目 60 分<br>3 回目以降 30 分 | ●    |      |   |   |   |       |
|     | 生食 50ml                       |  | ラインフラッシュ用                           | ●    |      |   |   |   |       |

※カルバート式より算出する。カルバート式：用量 = 目標 AUC × (Ccr + 25)