

|         |             |
|---------|-------------|
| 対象臓器    | 肺           |
| レジメンコード | LU0090      |
| レジメン名   | 肺 CBDCA+ETP |
| コースの日数  | 21 日        |
| 催吐リスク   | 中等度+a       |

| 種類  | 薬剤名                           | 用量                       | 点滴時間      | Day1 | Day2 | Day3 | ～ | ～ | Day21 |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|---|---|-------|
|     | 生食 250ml                      |                          | ラインクープ用   | ●    | ●    | ●    |   |   |       |
| 制吐剤 | アロカシ注<br>デキサト注<br>ゲラセト注 100ml | 6.6mg/body<br>3.0mg/body | 30 分      | ●    |      |      |   |   |       |
| 制吐剤 | デキサト注<br>生食 50ml              | 6.6mg/body               | 5 分       |      | ●    | ●    |   |   |       |
| 抗癌剤 | カネプラチン注<br>5%ブドウ糖 250ml       | AUC 5 ※                  | 60 分      | ●    |      |      |   |   |       |
| 抗癌剤 | ラステット注<br>生食 500ml            | 100mg/m <sup>2</sup>     | 120 分     | ●    | ●    | ●    |   |   |       |
|     | 生食 50ml                       |                          | ラインフラッシュ用 | ●    | ●    | ●    |   |   |       |

※カルバート式より算出する。カルバート式：用量 = 目標 AUC × (Ccr + 25)