

| | |
|---------|---------|
| 対象臓器 | 大腸 |
| レジメンコード | CO0140 |
| レジメン名 | IRIS 療法 |
| コースの日数 | 35 日 |
| 催吐リスク | 中等度 |

| 種類 | 薬剤名 | 用量 | 点滴時間 | Day1 | Day2 | Day3 | Day15 | Day16 | Day17 | ～ | Day35 |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------|----------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 生食 250ml | | ラインプ [®] 用 | ● | | | ● | | | | |
| 制吐剤 | デキサメタゾン注 パロメチン注 50ml | 9.9mg/body 0.75mg/body | 5 分 | ● | | | ● | | | | |
| 抗癌剤 | イリリチン注 5%ブドウ糖 250ml | 80mg/m ² | 90 分 | ● | | | ● | | | | |
| | 生食 50ml | | ラインフラッシュ [®] 1用 | ● | | | ● | | | | |
| 抗癌剤 | イリリチン OD 錠 | 80mg/m ² ※ | 1 日 2 回 | ● | Day1 は夕食後から服用開始。21 日間服用、14 日間休薬。 | | | | | | |
| 制吐剤 | デキサメタゾン錠 | Day2-3 : 8mg | 1 日 1～2 回 | | ● | ● | | ● | ● | (院外処方) | |

※イリリチン OD 錠の用量は、添付文書に準ずる。