

対象臓器	胆道
レジメンコード	BI0010
レジメン名	胆 GCS 療法
コースの日数	14 日
催吐リスク	中等度

種類	ルート	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	～	～	Day14
	側管①	生食 500ml	ハイドレーション	90 分	●					
	メイン	生食 50ml		メインのプライミング用	●					
制吐剤	メイン	デキサト注 パロセチン注 50ml	9.9mg/body 0.75mg/body	30 分 側管①と同時	●					
抗癌剤	メイン	シスプラチン注 生食 250ml	25mg/m <sup>2</sup>	60 分	●					
抗癌剤	メイン	ゲムシタビン注 生食 100ml	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	●					
	側管②	生食 500ml	ハイドレーション	90 分	●					
	メイン	生食 250ml	ハイドレーション	30 分	●					
抗癌剤		エリツタイン OD 錠	80mg/m <sup>2</sup> ※	1 日 2 回	●	Day1 は夕食後から服用開始。7 日間服用、7 日間休薬。				

※エリツタイン OD 錠の用量は、添付文書に準ずる。

※側管から生食を流しながら、メインを制吐剤→シスプラチン→ゲムシタビン→生食の順に投与する。