

対象臓器	胆道
レジメンコード	BI0060
レジメン名	胆 Durva+GC 療法
コースの日数	21 日
催吐リスク	中等度

種類	ルート	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day8	Day9	Day10	～	Day21
	メイン	生食 50ml	ラインク [®] 用	メインのプライミング用	●							
抗癌剤	メイン	イフィゾ [®] 注 生食 250ml	1500mg/body	60 分	●							
	側管①	生食 250ml	ハイドレーション	60 分	●							
	側管①	生食 500ml	ハイドレーション	90 分				●				
	メイン	生食 50ml		メインのプライミング用				●				
制吐剤	メイン	テチート注 パロセチン注 50ml	9.9mg/body 0.75mg/body	5 分 側管①と同時	●			● (30 分)				
抗癌剤	メイン	シプロラチン注 生食 250ml	25mg/m ²	60 分	●			●				
抗癌剤	メイン	ゲムシタ [®] 注 生食 100ml	1000mg/m ²	30 分	●			●				
	側管②	生食 500ml	ハイドレーション	90 分	●			●				
	メイン	生食 250ml	ハイドレーション	30 分	●			●				

※イフィゾ[®]投与後、側管から生食を流しながら、メインを制吐剤→シプロラチン→ゲムシタ[®]→生食の順に投与する。

◆最大 8 コース終了したら、その後は、イフィゾ[®]注のみを 4 週毎に投与する。